

# 醫院腰椎融合手術 ERAS 臨床共識盤點清單 (第 次)

日期： 年 月 日

參與人員	外科醫師：	麻醉醫師：	其他人員：
ERAS 術式	Lumbar spinal fusion surgery	Others:	
收案病人	單線收案	單一醫師收案：	多位醫師收案：
療程啟動	外科門診	麻諮門診	住院照會 其它：

Items	Status				Details
Pre-admission	已執行	1 <sup>st</sup> 優先	2 <sup>nd</sup> 優先	3 <sup>rd</sup> 優先	已執行項目 (可多選)
Preadmission information, education, and counselling (ERAS)					說明人員： 外科醫師 麻醉醫師 護理師 個管師 其它：
Preoperative optimization					外科風險評估 麻醉風險評估 用藥諮詢 其它：
Prehabilitation					專責 ERAS 物理治療師 心肺功能評估 術前復健介入 其它：
Preoperative nutritional care					專責 ERAS 營養師 術前營養篩檢 術前營養評估及介入 (手術及疾病飲食衛教) 其它：
Preoperative smoking and alcohol consumption					戒菸戒酒諮詢 酒癮者術前戒酒 ≥ 四週 術前戒菸 ≥ 四週 其它：
Management of anemia					術前貧血評估 術前貧血治療 其它：

Pre-operative	已執行	1 <sup>st</sup> 優先	2 <sup>nd</sup> 優先	3 <sup>rd</sup> 優先	已執行項目 (可多選)
Pre-anesthetic medication					術前疼痛風險評估 術前 pre-emptive 止痛用藥 術前止痛處置 避免常規使用 BZDs 來降低焦慮 其它：
Prevention of nausea and vomiting (PONV)					術前 PONV 風險評估 術中預防 PONV (含 TIVA、Dexamethasone) 其它：
Antimicrobial prophylaxis and skin preparation					Antiseptic shower 皮膚消毒 (Chlorhexidine-alcohol 為佳) 預防性抗生素 (劃刀前 60 分鐘內) 手術當天除毛 (Hair clipping) 其它：
Preoperative fluid and electrolyte therapy					鼓勵 oral intake 避免常規術前輸液 其它：
Preoperative fasting and carbohydrate loading					常規術前 2 小時澄清液禁食、術前 6 小時固體食物禁食 高糖飲品 (非糖尿病病人) 其它：

Intra-operative	已執行	1 <sup>st</sup> 優先	2 <sup>nd</sup> 優先	3 <sup>rd</sup> 優先	已執行項目 (可多選)
Standard anesthetic protocol					短效麻醉用藥 合併 regional & general anesthesia BIS OMT+Sug 其它：
Intraoperative fluid and electrolyte therapy					Advanced hemodynamic monitor GDFT (多節數) Zero-balance (短節數) Balanced crystalloids 優於 0.9% normal saline 術中低血壓可用 vasopressors、limited amount of fluid 處理 其它：
Preventing intraoperative hypothermia					核心體溫量測 主動保溫 (持續至術後) 術前預保溫 輸血加溫器 其它：
No routine placement of drainage in short segment lumbar fusion surgery					No routine use (短節數) 其它：
Surgical techniques					Minimally invasive Traditional Case-by-case basis 其它：
Local anesthetic techniques					Intrathecal analgesia Epidural analgesia Locoregional blocks Wound infiltration 其它：


Post-operative	已執行	1 <sup>st</sup> 優先	2 <sup>nd</sup> 優先	3 <sup>rd</sup> 優先	已執行項目 (可多選)
Multimodal analgesia					PCEA NSAID + acetaminophen Precedex or lidocaine infusion Trunk block Wound infiltration 其它：
Thromboprophylaxis					Early ambulation 特殊族群使用抗凝藥物控制 其它：
Early removal of urinary catheter					No routine use (短節數) Early removal of Foley catheter 其它：
Early postoperative oral nutrition					術後及早進食 術後營養評估及介入 其它：
Early mobilization and in-hospital physical therapy					專責 ERAS 物理治療師 術前漸進式活動衛教 術後團隊鼓勵下床 (VAS < 3) 術後物理治療 其它：

Overall	已執行	1 <sup>st</sup> 優先	2 <sup>nd</sup> 優先	3 <sup>rd</sup> 優先	已執行項目 (可多選)
Audit					要素執行率 (Compliance) 術後住院天數 (LOS) 術後併發症發生率 30 天內再住院率 其它：
Regular team meeting					隔週 一個月 二個月 一季 其它：

填寫完成請記得另存新檔

## 填寫說明：

- 本文件為可填寫 PDF 數位檔，建議使用 Adobe Acrobat Reader 開啟，由上方【簽署 (S)】⇒開啟【填寫和簽署】，直接在文件中【勾選】或【填寫】，完成後【另存新檔】即可。
- 如欲去除「提示螢光標示」：由上方工具列【編輯 (E)】⇒開啟【偏好設定】⇒開啟【表格】⇒在螢光標示色彩欄位中，取消【顯示欄位邊框顏色變化 (B)】⇒確認即可。



## 臨床共識：

- 需由 ERAS 團隊成員 (至少有外科醫師及麻醉醫師) 一起進行共識形成，依目前狀況填寫。
- ERAS 術式：確認 ERAS 欲收案術式。
- 收案病人：「單線收案」指一次收案一位，出院後再收案一位；「單一醫師收案」指只限一位外科醫師病人收案。
- 確實已執行要素：在「已執行」註記且在「已執行項目」中勾選已執行細項。
- 未執行要素：依預期要素落實先後，分別列優先順序 (1st 優先, 2nd 優先, 3rd 優先)。
- 每一要素都必須有落實時間表及負責人員，並同時啟動相關臨床指標收集。
- 建議至少每季進行「再共識」，並與前次盤點清單比較，用 audit 數據來追蹤 ERAS 團隊合作成果。

## 版權說明：

本文件版權屬於 ERAS® Society 及「台灣術後加速康復學會」所有，均受中華民國著作權法和國際著作權條約及其他智慧財產權法規與條約之保護。

非經權利單位授權同意，任何人不得以任何形式轉載、修改、傳輸、再製、散布、顯示、出版或傳播。

## 縮寫說明：

BIS (Bispectral Index), GDFT (Goal-directed Fluid Therapy), LMWH (Low Molecular Weight Heparin), LOS (Length of Stay), OMT (Optimal Muscle Tension), PCEA (Patient Controlled Epidural Analgesia), PONV (Postoperative Nausea & Vomiting), Sug (Sugammadex), TIVA (Total Intravenous Anesthesia), VAS (Visual Analogue Scale)

ERAS 指引下載

## 意見回饋：

此共識盤點清單由「台灣術後加速康復學會」發行，在使用有任何問題，歡迎來信詢問：[taiwaneras@gmail.com](mailto:taiwaneras@gmail.com)